

医療機関での接種

かかりつけ医でなくても接種できる医療機関もあります。また、各医療機関で予約方法が異なるので、接種券に同封している医療機関一覧か市ホームページを参考に、接種を希望する医療機関に確認してください。

使用ワクチン

ファイザー社製か
武田/モデルナ社製

※使用するワクチンについては、各医療機関へ問い合わせてください。

予約方法

- 下記の(1)~(4)のいずれか。
- (1)市コールセンター(☎0120・210・750)
 - (2)直接、医療機関へ電話か来院
 - (3)予約Webサイト
 - (4)各医療機関の予約サイト



予約Webサイト

市集団接種会場での接種

使用ワクチン 武田/モデルナ社製

予約方法 下記の(1)~(2)のいずれか。
(1)予約Webサイト
(2)市コールセンター
(☎0120・210・750)

接種会場 ◇メイシアター
◇千里市民センター



予約Webサイト

予約開始日と接種日

予約開始日	接種日
2月25日(金)正午	3月3日(休)、5日(土)、6日(日)
3月4日(金)正午	3月10日(休)、12日(土)、13日(日)
3月11日(金)正午	3月17日(休)、19日(土)、20日(日)
3月18日(金)正午	3月24日(休)、26日(土)、27日(日)

※4月以降の予約情報については、市ホームページや市報などでお知らせします。

その他の会場でのワクチン接種

国(自衛隊)や大阪府でも接種センターを設置して、3回目接種を行っています。予約方法など詳しくは、ホームページなどで確認してください。



自衛隊ホームページ



府コロナワクチン接種センターホームページ

接種後の副反応

追加(3回目)接種後についても、1、2回目同様に接種部位の痛みや頭痛、発熱などの症状が現れることがありますので、副反応について十分に理解したうえで、接種してください。接種翌日をピークに発現することが多いため、接種日の翌日は休養が取れるよう接種日程を調整することをお勧めします。

まれに、アナフィラキシー(急性アレルギー反応)が起こっても、すぐに対応できるよう、ワクチン接種会場や医療機関では医薬品などを準備しています。

ワクチン接種後、数日以内に胸痛、動悸、息切れ、むくみなどの症状があれば、すぐに医療機関を受診してください。

全国における副反応疑い報告(1月2日時点)

	接種回数	副反応報告	重篤報告	死亡報告
ファイザー社	1億6829万6343回	2万6599件(0.02%)	5663件(0.00%)	1056件(0.00%)
武田/モデルナ社	3243万5344回	4099件(0.01%)	696件(0.00%)	53件(0.00%)
アストラゼネカ社	11万5501回	16件(0.01%)	11件(0.01%)	0件(0.00%)

※現時点では、ワクチンと因果関係があると結論付けられた死亡事例はありません。

※1月21日開催の厚生労働省科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)資料より抜粋。

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

(2月14日時点)

☎保健センター(☎4798・5675) FAX6339・7075

市では、国が示すスケジュールなどを踏まえながら、3回目接種の接種券発送、5~11歳の人への接種準備などを進めています。最新情報は市ホームページや市公式SNSなどでお知らせしますので確認してください。



市ホームページ



市公式LINE



市公式Twitter

追加(3回目)接種可能日の前倒し

追加(3回目)接種の対象は、2回目接種から原則8か月以上経過した18歳以上の人ですが、ワクチン接種の予約状況などから、2回目接種から6か月以上経過した人は接種可能になりました。

市では、接種券発送スケジュールの前倒しや、接種券の早期発行申請などを行っています。発送スケジュールの変更や申請方法など詳しくは、市ホームページなどで確認してください。



接種券発送について

追加(3回目)接種に使用するワクチン

1、2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社製か武田/モデルナ社製のワクチンを使用します。ファイザー社製は1、2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社製は半量になります。

追加(3回目)接種の前倒しにより武田/モデルナ社製ワクチンの供給数が多くなります

追加(3回目)接種の接種間隔は、当初予定されていた「2回目接種から8か月以上経過した人」から、対象となるすべての人が「2回目接種から6か月以上経過した人」に変更になりました。この大幅な前倒しに対応するため、ワクチンが前倒しで供給されることとなりますが、その多くは武田/モデルナ社製です。

1、2回目と異なるワクチンを用いて追加(3回目)接種した場合の安全性と効果

イギリスでは、2回目接種から12週以上経過した後に、さまざまなワクチンを用いて追加(3回目)接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

追加(3回目)接種後7日以内の副反応は、1、2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性は許容できる。

効果

1、2回目接種でファイザー社製ワクチンを受けた人が、追加(3回目)接種でファイザー社製ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社製ワクチン(※)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇する。

(※)武田/モデルナ社製ワクチンは、3回目は50μg接種することになっていますが、本研究では100μg接種した結果が報告されています。

追加(3回目)接種場所

新型コロナワクチン追加(3回目)接種については、1、2回目と同じ場所でなくても接種が可能です。

1、2回目接種場所	3回目接種場所
市内医療機関	左記いずれかの接種場所から選択し、接種することができます。
市の集団接種会場	
国(自衛隊)大規模接種会場	
府大規模接種会場	