

令和7年度（2025年度）浮遊粒子状物質濃度の月別変化

測定局	項目	令和7年							令和8年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間	
吹田市垂水局	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	27	31	30	31	31	28	31	361
	測定時間	時間	717	742	708	741	741	662	742	718	742	741	670	742	8666
	平均値	mg/m ³	0.016	0.014	0.017	0.023	0.023	0.015	0.009	0.013	0.010	0.011	0.014	0.013	0.015
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.052	0.042	0.045	0.113	0.071	0.065	0.022	0.039	0.035	0.048	0.066	0.078	0.113
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.027	0.029	0.029	0.058	0.039	0.036	0.016	0.025	0.025	0.034	0.033	0.030	0.058
吹田 簡易裁判所局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	718	742	718	741	739	668	742	718	742	740	670	738	8676
	平均値	mg/m ³	0.015	0.014	0.017	0.020	0.021	0.014	0.011	0.015	0.012	0.012	0.015	0.014	0.015
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.045	0.039	0.039	0.107	0.085	0.099	0.051	0.056	0.032	0.043	0.049	0.038	0.107
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.025	0.027	0.026	0.050	0.034	0.024	0.017	0.027	0.025	0.034	0.028	0.030	0.050
吹田市 高野台局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	3	-	306
	測定時間	時間	717	742	718	741	741	672	742	718	742	741	83	-	7357
	平均値	mg/m ³	0.016	0.015	0.016	0.020	0.020	0.013	0.008	0.012	0.009	0.010	0.011	-	0.014
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.092	0.062	0.041	0.104	0.122	0.058	0.020	0.116	0.029	0.046	0.022	-	0.122
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.029	0.030	0.026	0.051	0.035	0.032	0.013	0.022	0.021	0.033	0.015	-	0.051

※吹田市高野台局は令和8年2月から測定終了。